

Espèces inventoriées lors de la campagne de démoustication de confort 2022 sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz

	Espèces	Ponte	Gîtes larvaires	Dynamique	Mobilité	Agressivité	Présence	Compétence vectorielle
Espèces inventoriées par prélèvements aléatoires de larves lors de prospection	Aedes caspius	Ponte sur substrat exondé	Zones humides salées/saumâtres	Jusqu'à 12 générations/an en fonction des remises en eau	10-20 km en moyenne et jusqu'à 45 km à l'automne	Très forte à l'extérieur, surtout à l'aube et au crépuscule	Février à Octobre	West Nile, Tahyna, Myxomatose
	Aedes détritrus	Ponte sur substrat exondé	Zones humides salées/saumâtres	Jusqu'à 12 générations/an en fonction des remises en eau	Jusqu'à 20 km	Très forte à l'extérieur, surtout à l'aube et au crépuscule	Permanente, avec pause estivale	Chikungunya, Myxomatose
Espèces inventoriées lors des captures méthode OMS	Aedes caspius	Ponte sur substrat exondé	Zones humides salées/saumâtres	Jusqu'à 12 générations/an en fonction des remises en eau	10-20 km en moyenne et jusqu'à 45 km à l'automne	Très forte à l'extérieur, surtout à l'aube et au crépuscule	Février à Octobre	West Nile, Tahyna, Myxomatose
	Aedes détritrus	Ponte sur substrat exondé	Zones humides salées/saumâtres	Jusqu'à 12 générations/an en fonction des remises en eau	Jusqu'à 20 km	Très forte à l'extérieur, surtout à l'aube et au crépuscule	Permanente, avec pause estivale	Chikungunya, Myxomatose
	Culex pipiens	Ponte à la surface de l'eau	Eau douce stagnante dans gîtes urbains	Plusieurs générations/an	Quelques centaines de mètres en milieu urbain, jusqu'à 3 km en gîtes péri-urbain	Très forte la nuit	Avril à Octobre, permanent sur gîtes urbains couverts et chauffés en hiver.	West Nile, Tahyna, Fièvre de la Vallée du Rift
	Anophèle maculipennis	Ponte à la surface de l'eau	Eau douce, claire, fraîche et ombragée	Plusieurs générations/an				Paludisme (Malaria), Tahyna, Myxomatose, Tularémie.
	Culiseta annulata	Ponte à la surface de l'eau	Eau douce stagnante plutôt riche en matière organique	Plusieurs générations/an		Plutôt ornithophile mais non selectif (pique tous les vertébrés à sang chaud): nuisance la nuit	Permanente pour les femelles et de Février à Octobre pour les mâles	West Nile, Tahyna, Myxomatose
	Anophèle plumbeus	Ponte à la surface de l'eau	Zone forestière (creux d'arbres) et gîtes artificiels	Deux à trois générations/an	Quelques kilomètres	Espèce agressive qui pique l'homme le soir et la nuit en intérieur comme extérieur	Permanente pour les larves et de Mars à Octobre pour les adultes	West Nile, Paludisme (Malaria)